





## INFO DÉSHÉRBAGE D'ÉTÉ

LA PHASE D'IMPLANTATION DE LA LUZERNE EST LA PLUS SENSIBLE À LA CONCURRENCE DES ADVENTICES. UNE CONCURRENCE TROP FORTE EST À L'ORIGINE D'UNE PERTE DE PRODUCTIVITÉ ET PEUT MENACER LA PÉRENNITÉ DE LA CULTURE

### DICOTYLÉDONES

	Stade de la luzerne Feuille cotylédonaire à 1 feuille	Stade de la luzerne 1-2 feuilles trifoliées de la luzerne
	 <p>Adventices très jeunes Doses réduites (colonne ci-dessous)</p>	
<b>Flore dominante</b> <u>Sans matricaires</u> Colzas Chénopodes Sanves	Lentagran 0,5 kg/ha + Embutone RL 400 1,9 l/ha	Lentagran 1 kg/ha + Embutone RL 400 3 à 3,75 l/ha
<b>Flore dominante</b> <u>Avec matricaires</u> Colzas Capselles Amarantes	Basagran SG 0,3 kg/ha + Embutone RL 400 1,9 l/ha	Basagran SG 0,4 à 0,6 kg/ha + Embutone RL 400 3 à 3,75 l/ha
<b>Flore dominante</b> <u>Avec matricaires</u> Capselles Amarantes	Lentagran 0,5 kg/ha + Basagran SG 0,3 kg/ha	Lentagran 1 kg/ha + Basagran SG 0,4 à 0,6 kg/ha
<b>Remarques</b>	En dose réduite un deuxième passage est souvent nécessaire surtout en cas de levées échelonnées ou pour renforcer l'efficacité. Sur parcelles à risque matricaire, privilégier les mélanges à base de Bentazone (Basagran SG ou Adagio SG), aucune solution de rattrapage n'étant possible après (inefficacité du Nirvana S sur matricaire)	Si présence de très fortes populations de colzas, Embutone RL 400 : 4 à 4,5 l/ha

L'application de Nirvana S à 2 l/ha est possible à partir du stade 2 feuilles trifoliées de la luzerne. Cependant, elle ne nous semble pas adaptée à ce stade du fait d'inefficacités sur certaines adventices (matricaires) impossibles à combler par la suite.



Aucun traitement par température > à 25 °c  
Nécessité d'une très bonne hygrométrie.  
Volume d'application 300 l/ha

A  
G  
R  
O  
N  
O  
M  
I  
E  
  
L  
U  
Z  
E  
R  
N  
E

## GRAMINÉES

Dose suivant le stade de la graminée. Intervenir à partir du stade 3 feuilles de la graminée.

TARGA D +: à partir de 0,3 l/ha + huile  
Très efficace sur repousse de céréales.

STRATOS ULTRA: à partir de 2 l/ha  
Délai avant récolte de 150 jours

OGIVE: à partir de 0,4 l/ha + huile  
Délai avant récolte de 240 jours (intérêt sur ray-grass et vulpins résistants).

Par rapport à un traitement anti dicotylédones, traiter 2 jours avant ou 8 jours après

## AVERTISSEMENT:

***Ce document a pour vocation de vous donner des clés de décision quant à la pertinence d'application d'un herbicide sur vos cultures. Ainsi, toute intervention devra être basée sur un diagnostic à la parcelle.***

***Consulter l'étiquetage du bidon avant toute décision d'application et ce quel que soit le produit. Respecter rigoureusement l'homologation et les consignes d'application.***



## TABLEAU DES EFFICACITÉS DES DESHERBANTS A L'IMPLANTATION

MODE de SEMIS Désér. en année d'impl. ● PERMIS ○ PROSCRIT	STADE D'APPLICATION		HERBICIDES			EFFICACITE HERBICIDE																											
	Luzerne	Adventices	PRODUITS noms commerciaux	MATIERES actives	Remarques	GRAMINEES														DICOTYLEDONES													
						annuelles														vivaces													
	SEMS LEVEE	1 feuille trifoliée 2 feuilles trifoliées 4 feuilles trifoliées				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>● Très bonne &gt; 90 %</span> <span>● Bonne 80 à 90 %</span> <span>● Moyenne 70 à 80 %</span> <span>○ Insuffisante &lt; 70 %</span> <span>□ Pas de référence</span> </div>																											
						Sans effet																											
			LENTAGRAN	PYRIDATE	DAR 28 jours	Sans effet																											
			EMBUTONE RL 400	2,4 DB	lent d'action DAR 60 j	Sans effet																											
			BASAGRAN SG OU ADAGIO SG	BENTAZONE	DAR 60 j	Sans effet																											
			LENTAGRAN + EMBUTONE RL400	PYRIDATE + 2,4 DB		Sans effet																											
			LENTAGRAN + BASAGRAN SG	PYRIDATE + BENTAZONE		Sans effet																											
			BASAGRAN SG + EMBUTONE RL400	BENTAZONE et 2,4 DB		Sans effet																											
		après	TARGA D+ ou PILOT	QUIZALOFOP ETHYL ISOMERE D	TARGA +Huile	Sans effet																											
		3 feuilles	OGIVE	CLETHODIME	avec huile DAR 240 j	Sans effet																											
		de la graminée	STRATOS ULTRA	CYCLOXYDIME	sans huile DAR 150 j	Sans effet																											